

“吳羽”克裏美淨[®]細粒

KREMEZIN[®]

【成份】“吳羽”克裏美淨細粒每包含 2 公克活性炭。無添加賦型劑。

【適應症】緊急治療藥物或化學品中毒之病人。吸附干擾胃腸道的細菌性毒素、消化性毒素及其他有機性廢物、解除腸內滯留氣體及有關症狀。

【用法用量】醫師藥師藥劑生指示藥品。

成人及 12 歲以上兒童之使用劑量及方法：急性中毒時，儘快使用 50-100 公克之活性炭（25-50 包“吳羽”克裏美淨）。嚴重中毒時，服用初劑量後，每 4 至 6 小時應再服用 20 公克活性炭（10 包“吳羽”克裏美淨），連續數天。“吳羽”克裏美淨可在嘔吐或洗胃後使用。

12 歲以下兒童之使用劑量及方法：活性炭用在小孩之推薦劑量是每公斤體重給予 1 公克之活性炭。急性中毒時，依小孩之體重和中毒之程度給予 10-50 公克之活性炭（5-25 包“吳羽”克裏美淨）；幼兒初劑量給予 10-20 公克之活性炭（5-10 包“吳羽”克裏美淨），數分鐘後根據醫師指示，可重複給藥；較大的小孩則儘量給予大劑量 30-50 公克之活性炭（15-25 包“吳羽”克裏美淨）。

【禁忌】

患者必須使用口服藥劑或口服特殊之解毒劑時，不可使用活性炭。

患有消化道輸送失調 (transit disorder) 的病人，“吳羽”克裏美淨可能會干擾排泄。

【副作用、警語和注意事項】

〈下列病人在服用本產品時應小心注意〉

(1) 患有消化性潰瘍或食道靜脈曲張的病人。
[本產品是以固態狀態下經過消化道，可能會刺激經過區域]

(2) 病人有便秘的傾向。[本產品也許會加重便秘的情況及增加有潛在肝疾病之病人的血中氨濃度]

發生中毒時先使用“吳羽”克裏美淨後，立即送醫急救。服用“吳羽”克裏美淨會造成黑便。由於其對腐蝕性物質引起之中毒無效，因此，如確定是由腐蝕性物質引起之中毒，應避免使用本品。“吳羽”克裏美淨對

氰化物、鐵鹽、鋰鹽、甲醇、乙醇和乙二醇吸附力差。這些都併用特殊之解毒劑：

毒物	特殊解毒劑
氰化物	亞硝酸鈉
鐵鹽	Deferoxamine
鋰鹽	Calcium polystyrene sulphate
甲醇	乙醇
乙二醇	乙醇

對許多中毒病例常必須併用“吳羽”克裏美淨和其特殊解毒劑，以達到確實解毒效果（如嚴重 paracetamol 中毒，須併用 N-acetyl 用 N-acetyl cysteine 效果更佳）。

一般患者對“吳羽”克裏美淨之接受性很好，只有少數患者可能會有便秘和腹瀉現象，如發生便秘可以 Liquid Paraffin, Lactulose 或其他緩瀉劑治療。

懷孕及哺乳：本品對胎兒或幼兒不會造成任何影響。

【交互作用】

當合併使用其他藥物，在考量本產品為吸附劑的情況下，不應同時使用。“吳羽”克裏美淨通常會降低口服藥劑之效果，如降壓劑、類風濕關節炎治療劑等。同時服用避孕藥時，必須請教醫師。

【包裝】

2gm 鋁箔包裝，3~500 包盒裝

製造廠：Kureha Corporation

製造廠址：16, Ochiai, Nishiki-machi, Iwaki, Fukushima, Japan

公司地址：3-26-2, Hyakunin-cho, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan

分包裝廠：昱昇藥業有限公司

地址：桃園縣蘆竹鄉南山路一段436號

藥商：杏昌醫藥科技股份有限公司

地址：台北市松山區民生東路三段 107 巷 6 號 2 樓

諮詢電話：02-2715-1651

免費諮詢服務專線：0800-235393